

POPULAÇÃO A SER CONTEMPLADA NAS COMORBIDADES, PARA VACINA DA COVID.



Na fase I, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, sendo maiores de 18 anos:

Nº	COMORBIDADE	PUBLICO A SER ATENDIDO
01	Síndrome de Down	As pessoas com síndrome de down, independente da idade;
02	Renais crônicos	Os pacientes renais em diálise independente da idade, sendo maior de 18 anos;
03	Gestantes/ Puérperas	As gestantes e puérperas com comorbidades independente da idade;
04	**Pessoas com comorbidades	Pessoas com comorbidades com 55 a 59 anos;
05	Pessoas com Deficiência Permanente	Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos;



Na fase II, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:

Nº	COMORBIDADE	PUBLICO A SER ATENDIDO
01	**Pessoas com comorbidades	**Pessoas com comorbidades, por ordem decrescente de idade, 54 a 18 anos;
02	Pessoas com Deficiência Permanente	Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), por ordem decrescente de idade de 54 a 18 anos;
03	Gestantes e puérperas	Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes;

**** Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19.**

Grupo de comorbidades	Descrição
Diabetes melitus	Qualquer indivíduo com diabetes;
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia bronco pulmonar e asma grave uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática;
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR= Quando a pressão arterial PA permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos;
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg(independente da presença de lesão em órgão Halvo LOA ou comorbidade);
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão Halvo LOA e/ou comorbidade;

Insuficiência cardíaca IC	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association;
Cor-pulmonale e Hipertensão(pulmonar)	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária o secundária;
Cardiopatia hipertensiva	Cardiopatia hipertensiva hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo;
Síndromes coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio e outras;
Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras)
Miocardopatias e Pericardopatias	Miocardopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos;
Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)
Cardiopatias congênita no adulto	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico;
Próteses(valvares)e(Dispositivos(cardíacos) implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, ressinchronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)
Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular;
Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais taxa de filtração glomerular;
Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV CD4 (10 mg/dia ou recebendo 22 pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias;
Anemia falciforme	Anemia falciforme.